

Comune di Verona



amia

AMIA Verona S.P.A.

60042 Via Cendrata

**ANALISI ALBERATE
CON METODO ESP e Schede VTA Classi D**

STUDIO VERDE SRL

Daniele Pecollo

Dottore Forestale ed Ambientale
Cell. 3492926867



27 dicembre 2024

Località: 60042 - Via Cendrata (26 ESP) - Valutatore: Daniele Pecollo

Data 12/12/2024

Alberata già in parte sostituita con nuovi esemplari arborei (circa il 50% ad oggi già sostituiti). Diffuse problematiche di mantenimento futuro a causa di problematiche meccaniche-strutturali derivate da marciumi alle radici, carie del legno al colletto, carpofori fungini di Phellinus punctatus sul fusto, seccume in quota e scarso vigore della chhioma. Tali problematiche rendono l'attuale specie (Robinia) non piu' adatta e funzionale allo scopo di alberata nella via in esame.

N°	specie	Ø	H	Note	Interventi	analisi strumentali		
192	Robinia	30		scheda VTA	Phellinus punctatus al castello. Esemplare da abbattere per 1) impossibilità di cura 2) pericolo di rottura del fusto in quanto tale patogeno è molto aggressivo, 3) i carpofori producono spore in grado di aggredire le altre Robinie. 4) prospettive statiche e fisiologiche ridotte a causa della tipica attività ed aggressività del patogeno osservato (non curabile).	VTA		
193	Robinia	33		scheda VTA	Abbattimento per seccume diffuso e pericolante, con chioma in grave regressione. La rimonda dell'abbondante secco non consente di mantenere l'albero in salute. Prospettive statiche e fisiologiche ridotte non recuperabili.	VTA		
194	Robinia	29		scheda VTA	Phellinus punctatus sul fusto. Abbattimento per pericolo di rottura del fusto.	VTA		
195	Robinia	28		Fusto moderatamente inclinato, tumore sul fusto a 2,5 m, chioma asimmetrica. Al colletto R1 carie interna dal cm 22, R2 integro	Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno piu' marcato e rimonda del secco	R1 R2	0 0	0 180
196	Robinia	28		scheda VTA	Abbattimento per marciume alle radici oltre a carpofori di Phellinus punctatus a 6 m che indeboliscono la capacità di tenuta meccanica del fusto.	VTA		
197	Robinia	34		scheda VTA	Classe CD. In ottica conservativa Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno piu' marcato (cioè con sezioni di taglio fino a 5-6 cm) e rimonda del secco. In ottica NON conservativa abbattimento	VTA		
198	Robinia	30		scheda VTA	Abbattimento per pericolo di rottura del fusto (carpofori di Phellinus punctatus da 3 a 5 m) + secco pericolante	VTA		

199	Robinia	43		scheda VTA	Abbattimento per pericolo di rottura del fusto (carpofori di Phellinus punctatus a 40 cm)	VTA		
200	Robinia	43		scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
201	Robinia	40	16	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
202	Robinia	45	16	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
203	Robinia	35	14	scheda VTA	Phellinus punctatus sul fusto. Esemplare da abbattere per 1) impossibilità di cura 2) pericolo di rottura del fusto in quanto tale patogeno è molto aggressivo, 3) i carpofori producono spore in grado di aggredire le altre Robinie. 4) prospettive statiche e fisiologiche ridotte a causa della tipica attività ed aggressività del patogeno osservato (non curabile).	VTA		
204	Robinia	44	16	Necrosi sul fusto lati NE-O-S. Dendrogrammi al colletto integri	Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno + Rimonda del secco urgente (rami secchi nel lato Nord)	R1 R2	0 220	90 90
205	Robinia	36	15	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
206	Robinia	37	14	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno. Inoltre carpofori fungini di Phellinus punctatus sul fusto: pericolo di rottura del fusto.	VTA		

207	Robinia	40	13	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
208	Robinia	45	17	Sottoservizi lato S. Necrosi sul fusto da 2 a 5 m lati NE e N e nel lato S da 2 a 5 m per sospetta aggressione da Phellinus punctatus. Al colletto dendrogramma integro	Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno piu' marcato e rimonda del secco	R1	0	190
209	Robinia	34	13	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
210	Robinia	36	16	Decadimento al colletto (accentuato) lato NO. Radice strozzante lato SO. Dendrogrammi al colletto integri	Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno piu' marcato e rimonda del secco	R1 R2	0 0	160 300
211	Robinia	38	16	scheda VTA	Phellinus punctatus sul fusto. Esemplare da abbattere per 1) impossibilità di cura 2) pericolo di rottura del fusto in quanto tale patogeno è molto aggressivo, 3) i carpofori producono spore in grado di aggredire le altre Robinie. 4) prospettive statiche e fisiologiche ridotte a causa della tipica attività ed aggressività del patogeno osservato (non curabile).	VTA		
212	Robinia	38	17	scheda VTA	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.	VTA		
Sono da aggiungere 5 piante di Robinia (non numerate) al momento in buona salute, per le quali va eseguita la potatura (Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno e rimonda del secco)								

Specie: Robinia pseudoacacia

Numero pianta: 192

Città: Verona

Sito d'impianto: Filare

Località: 60042 Via Cendrata

Diametro cm.: 30

Altezza m.: 14



Analisi visiva

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 47

Condizione vegetativa:

Classe: D

Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

radice strozzante (moderato) lato N;



Difetti fusto:

carpofori di agenti cariogeni sul fusto (grave) a 5 m lato Est;



Difetti castello/chioma:

ferite aperte al castello (accentuato) con Phellinus punctatus; chioma asimmetrica (moderato);



Interventi:


Phellinus punctatus al castello. Esemplare da abbattere per 1) impossibilità di cura 2) pericolo di rottura del fusto in quanto tale patogeno è molto aggressivo, 3) i carpofori producono spore in grado di aggredire le altre Robinie. 4) prospettive statiche e fisiologiche ridotte a causa della tipica attività ed aggressività del patogeno osservato (non curabile).

Note:

Commento:

Analisi strumentale non eseguita in quanto superflua alla luce delle gravi problematiche rilevate.

Numero pianta: 193



Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Interventi:
Abbattimento per seccume diffuso e pericolante, con chioma in grave regressione. La rimonda dell'abbondante secco non consente di mantenere l'albero in salute. Prospettive statiche e fisiologiche ridotte non recuperabili.
Note:
Commento:
Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente: R1 carie dal cm 17. R2 integro.

[illegible]

Specie: Robinia pseudoacacia

Città: Verona

Località: 60042 Via Cendrata

Analisi visiva+strumentale

Sito d'impianto: Filare

Diametro cm.: 29

Altezza m.: 12


Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 41

Condizione vegetativa:

Classe: D



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

decadimento all'interno del colletto (moderato);

Difetti fusto:

carpofori di agenti cariogeni sul fusto (grave);

Difetti castello/chioma:

seccume diffuso sulla chioma (accentuato);

Interventi:

Abbattimento per pericolo di rottura del fusto per carpofori di Phellinus punctatus sul fusto a 2 m lato SE

Note:

Commento:

Al colletto il dendrogramma rileva R1 carie interna dal cm 7 al cm 12,5.
Sul fusto in corrispondenza dei carpofori di Phellinus punctatus R2 rileva carie interna dal cm 7.

Analisi	H.terra	N.sens.	t	Diam. cm	t/R	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	0°	Radiale	/
R2	220	/	/	/	/	/	fusto	40°	Radiale	/

Specie:

Robinia pseudoacacia

Città:

Verona

Località:

60042 Via Cendrata

Analisi visiva

Sito d'impianto:

Filare

Diametro cm.:

28

Altezza m.:

11

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza:

39

Condizione vegetativa:

Classe:

D



Numero pianta: 196

Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐lieve ☒moderato ☐accentuato ☐grave

Difetti colletto:

cavità esposta al colletto (accentuato) lato ovest;
decadimento legnoso affiorante sul colletto (grave) lato ovest;

Difetti fusto:

fusto inclinato (accentuato);
necrosi sul fusto (accentuato);
carpofori di agenti cariogeni sul fusto (grave) di Phellinus punctatus a 6 m su forcella;

Difetti castello/chioma:

branche necrotiche (accentuato);

Interventi:

Abbattimento per marciume alle radici oltre a carpofori di Phellinus punctatus a 6 m che indeboliscono la capacità di tenuta meccanica del fusto.

Note:

Commento:

Analisi strumentale non eseguita in quanto superflua alla luce delle gravi problematiche rilevate.

Specie:

Città:

Località:

Analisi visiva+strumentale

Sito d'impianto:

Diametro cm.:

Altezza m.:


Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza:

Condizione vegetativa:

Classe:



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

necrosi corticale sul colletto (grave);

☒

Difetti fusto:

fusto inclinato (moderato);
necrosi sul fusto (grave) da terra fino a 3 m;

☒

Difetti castello/chioma:

Interventi:

Classe CD. In ottica conservativa Potatura di contenimento a tutta chioma con taglio di ritorno piu' marcato (cioè con sezioni di taglio fino a 5-6 cm) e rimonda del secco. In ottica NON conservativa abbattimento

Note:

Commento:

Al colletto i dendrogrammi rilevano:
R1 carie interna dal cm 20.
R2 integro.
Sul fusto:
R3 destrutturazione dal cm 14,5
R4 destrutturazione dal cm 10,5

Analisi	H.terra	N.sens.	t	Diam. cm	t/R	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	270°	Radiale	/
R2	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	90°	Radiale	/
R3	220	/	/	/	/	/	fusto	20°	Radiale	/
R4	220	/	/	/	/	/	fusto	110°	Radiale	/

Specie: Robinia pseudoacacia

Numero pianta: 198

Città: Verona

Sito d'impianto: Filare

Località: 60042 Via Cendrata

Diametro cm.: 30

Altezza m.: 11

Analisi visiva

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 37

Condizione vegetativa:

Classe: D

Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colto:

Difetti fusto:

fusto inclinato (lieve);
carpofori di agenti cariogeni sul fusto (grave) da 3 m a 5 m;

Difetti castello/chioma:

branche secche (accentuato);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Interventi:

Abbattimento per pericolo di rottura del fusto (carpofori di Phellinus punctatus da 3 a 5 m) + secco pericolante


Note:

Commento:

Analisi strumentale non eseguita in quanto superflua alla luce delle gravi problematiche rilevate.



Numero pianta: 199



Intensità del difetto:  lieve  moderato  accentuato  grave

Interventi:
Abbattimento per pericolo di rottura del fusto (carpofori di <i>Phellinus punctatus</i> a 40 cm)

Note:	

Commento:
Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente: R1 e R2 legno integro. R3 sul fusto diffusa carie.

[illegible]

Specie: Robinia pseudoacacia

Città: Verona

Località: 60042 Via Cendrata

Analisi visiva+strumentale

Sito d'impianto: Filare

Diametro cm.: 43

Altezza m.: 15


Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 35

Condizione vegetativa:

Classe: D



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

cavità esposta al colletto (moderato) lato NO;
decadimento legnoso affiorante sul colletto (grave) lato N;
marciume alle radici (grave);

Difetti fusto:

fusto inclinato (lieve);
depressione sul fusto (lieve);

Difetti castello/chioma:

chioma asimmetrica (lieve);

Interventi:

Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.

Note:

Commento:

Al colletto i dendrogrammi rilevano diffusa carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici.

Analisi	H.terra	N.sens.	t	Diam. cm	t/R	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	300°	Radiale	/
R2	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	180°	Radiale	/

Specie: Robinia pseudoacacia

Città: Verona

Località: 60042 Via Cendrata

Analisi visiva+strumentale

Sito d'impianto: Filare

Diametro cm.: 40

Altezza m.: 16


Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 40

Condizione vegetativa:

Classe: D



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

lesioni aperte sul colletto (moderato) lato SO;
processo di marciume alle radici (grave);

Difetti fusto:

fusto inclinato (lieve);
depressione sul fusto (moderato);

Difetti castello/chioma:

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (moderato);
chioma asimmetrica (moderato);
capitozzature sulla chioma (moderato) della branca primaria Est;

Interventi:

Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.

Note:

Commento:

Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente:
R1 carie interna dal cm 11,5.
R2 carie interna dal cm 10,5.
R3 carie interna dal cm 11,5.

Analisi	H.terra	N.sens.	t	Diam. cm	t/R	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	200°	Radiale	/
R2	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	320°	Radiale	/
R3	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	45°	Radiale	/

Specie:	Robinia pseudoacacia
Città:	Verona
Località:	60042 Via Cendrata
Analisi visiva	
Sito d'impianto:	Filare
Diametro cm.:	45
Altezza m.:	16
Diam. chioma m.:	
Altezza inser. chioma m.:	
Coefficiente di snellezza:	36
Condizione vegetativa:	
Classe:	D

Numero pianta: 

Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:	Interventi:
cavità esposta al colletto (grave) lato Est; processo di marciume alle radici (grave);	Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.
Difetti fusto:	Note:
fusto inclinato (moderato); necrosi sul fusto (moderato);	
Difetti castello/chioma:	Commento:
chioma asimmetrica (accentuato);	Analisi strumentale non eseguita in quanto superflua alla luce delle gravi problematiche rilevate.

Specie: Robinia pseudoacacia

Numero pianta: 203

Città: Verona

Sito d'impianto: Filare

Località: 60042 Via Cendrata

Diametro cm.: 35

Altezza m.: 14



Analisi visiva

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 40

Condizione vegetativa:

Classe: D

Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

decadimento legnoso affiorante sul colletto (moderato) lato N ed E;



Difetti fusto:

fusto inclinato (lieve);
carpofori di agenti cariogeni sul fusto (grave) di Phellinus punctatus lato N a 3,5 m;



Difetti castello/chioma:

scarso vigore vegetativo (moderato);



Interventi:

Phellinus punctatus sul fusto. Esemplare da abbattere per 1) impossibilità di cura 2) pericolo di rottura del fusto in quanto tale patogeno è molto aggressivo, 3) i carpofori producono spore in grado di aggredire le altre Robinie. 4) prospettive statiche e fisiologiche ridotte a causa della tipica attività ed aggressività del patogeno osservato (non curabile).

Note:

Commento:

Analisi strumentale non eseguita in quanto superflua alla luce delle gravi problematiche rilevate.

Specie: Robinia pseudoacacia

Città: Verona

Località: 60042 Via Cendrata

Analisi visiva+strumentale

Sito d'impianto: Filare

Diametro cm.: 36

Altezza m.: 15


Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 42

Condizione vegetativa:

Classe: D



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

cavità esposta al colletto (accentuato) lato N;
decadimento legnoso affiorante sul colletto (moderato) lato S;
processo di marciume alle radici (grave);

Difetti fusto:

fusto inclinato (lieve);

Difetti castello/chioma:

Interventi:

Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.

Note:

Commento:

Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente:
R1 carie diffusa.
R2 carie interna dal cm 11.

Analisi	H.terra	N.sens.	t	Diam. cm	t/R	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	10°	Radiale	/
R2	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	160°	Radiale	/

Specie:

Robinia pseudoacacia

Città:

Verona

Località:

60042 Via Cendrata

Analisi visiva

Sito d'impianto:

Filare

Diametro cm.:

37

Altezza m.:

14

Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza:

38

Condizione vegetativa:

Classe:

D

Numero pianta: 206



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

decadimento legnoso affiorante sul colletto (grave) lato NO;
processo di marciume alle radici (grave);

Difetti fusto:

fusto inclinato (accentuato);
carpofori di agenti cariogeni sul fusto (grave) di Phellinus punctatus a 3 m
lato Est;

Difetti castello/chioma:

branche secche (moderato);
scarso vigore vegetativo (accentuato);

Interventi:


Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno. Inoltre carpofori fungini di Phellinus punctatus sul fusto: pericolo di rottura del fusto.

Note:

Commento:

Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente:
Analisi strumentale non eseguita in quanto superflua alla luce delle gravi problematiche rilevate.

Numero pianta: 207




Intensità del difetto:  lieve  moderato  accentuato  grave

Interventi:
Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.
Note:
Commento:
Al colletto i dendrogrammi rilevano diffusa carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici.

[illegible]

Numero pianta: 209



Intensità del difetto: lieve moderato accentuato grave

Interventi:
Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.
Note:
Commento:
Al colletto i dendrogrammi rilevano diffusa carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici.

[illegible]

Numero pianta: 211

360°

45°

90°

135°

180°

225°

270°

315°

R1

R2

R3

Intensità del difetto:  lieve  moderato  accentuato  grave

Interventi:
Phellinus punctatus sul fusto. Esempio da abbattere per 1) impossibilità di cura 2) pericolo di rottura del fusto in quanto tale patogeno è molto aggressivo, 3) i carpofori producono spore in grado di aggredire le altre Robinie. 4) prospettive statiche e fisiologiche ridotte a causa della tipica attività ed aggressività del patogeno osservato (non curabile).
Note:
Commento:
Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente: R1 carie interna dal cm 20. R2 carie interna dal cm 13. R3 carie interna dal cm 11.

[illegible]

Specie: Robinia pseudoacacia

Città: Verona

Località: 60042 Via Cendrata

Analisi visiva+strumentale

Sito d'impianto: Filare

Diametro cm.: 38

Altezza m.: 17


Diam. chioma m.:

Altezza inser. chioma m.:

Coefficiente di snellezza: 45

Condizione vegetativa:

Classe: D



Ricontrollo entro: / mesi

Intensità del difetto: ☐ lieve ☒ moderato ☐ accentuato ☐ grave

Difetti colletto:

cavità esposta al colletto (moderato) lati O e NO;
sottoservizi interferenti con zolla radicale (moderato) del Gas lato S a 1,5 m;
processo di marciume alle radici (grave);

Difetti fusto:

fusto inclinato (moderato);
necrosi sul fusto (moderato);

Difetti castello/chioma:

branche primarie codominanti con corteccia inclusa (lieve);
chioma asimmetrica (accentuato);

Interventi:

Abbattimento per processo di marciume alle radici che indebolisce sensibilmente la capacità di ancoraggio. Pericolo di caduta dell'albero per rottura sotto il livello del piano di campagna. Impossibilità di cura del patogeno.

Note:


Pianta di testata

Commento:


Al colletto i dendrogrammi rilevano carie interna al colletto derivata dalla risalita del processo di marciume alle radici, precisamente:
R1 carie interna dal cm 9,5.
R2 carie interna dal cm 24.
R3 carie interna dal cm 11,5 al cm 20.

Analisi	H.terra	N.sens.	t	Diam. cm	t/R	N.File	Punto	Angolo	Direzione	Valori
R1	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	180°	Radiale	/
R2	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	45°	Radiale	/
R3	0	/	/	/	/	/	colletto-radici	300°	Radiale	/


193 r1.rgp




193 r2.rgp




194 r1.rgp




194 r2.rgp




195 r1.rgp




195 r2.rgp




197 r1.rgp




197 r2.rgp




197 r3.rgp




197 r4.rgp




199 r1.rgp




199 r2.rgp




199 r3.rgp




200 r1.rgp




200 r2.rgp




201 r1.rgp




201 r2.rgp




201 r3.rgp




204 r1.rgp




204 r2.rgp




205 r1.rgp




205 r2.rgp




207 r1.rgp




207 r2.rgp




208 r1.rgp




209 r1.rgp




209 r2.rgp




210 r1.rgp




210 r2.rgp




211 r1.rgp




211 r2.rgp




211 r3.rgp



212 r1.rgp



212 r2.rgp



212 r3.rgp

